



REDE FARMACÊUTICOS UMP INFO FARMÁCIA

EM ALERTA Quando o número de gotas conta: solução oral de Tramadol

Existem, em Portugal, 4 laboratórios farmacêuticos que comercializam o Tramadol (cloridrato) 100 mg/ml Gotas Orais, Solução: 1 dito de “marca” e 3 genéricos.

Curiosamente, na hora da prescrição e, subsequente, administração deste medicamento é necessário verificar qual das 4 soluções orais existe na UCCI, pois para uma mesma dosagem – 50 mg por exemplo – o número de gotas correspondentes da solução oral da Generis é metade do número de gotas correspondentes das demais soluções (ver tabela).

Assim, cabe-nos recomendar que a prescrição médica seja feita em “mg” (dosagem) e não em número de gotas ou em “ml” (volume) e que administração seja efetuada de acordo com a solução oral disponível.

A um erro de medicação dizemos não.

TRAMADOL (CLORIDRATO) 100 MG/ML GOTAS ORAIS, SOLUÇÃO

número de gotas	Tramal® (Grünenthal) Tramadol Ciclum® (Ciclum) Tramadol Meda® (Mylan) ^b		Tramadol Generis® (Generis) ^b	
	dosagem correspondente de cloridrato de tramadol (mg)	equivalência em ml	dosagem correspondente de cloridrato de tramadol (mg)	equivalência em ml
1 gota	2,5 mg	0,025 ml	5 mg	0,05 ml
5 gotas	12,5 mg	0,125 ml	25 mg	0,25 ml
10 gotas	25 mg	0,250 ml	50 mg	0,5 ml
15 gotas	37,5 mg	0,375 ml	75 mg	0,75 ml
20 gotas	50 mg	0,5 ml	100 mg	1 ml
25 gotas	62,5 mg	0,625 ml	125 mg	1,25 ml
30 gotas	75 mg	0,75 ml	150 mg	1,5 ml
35 gotas	87,5 mg	0,875 ml	175 mg	1,75 ml
40 gotas	100 mg	1 ml	200 mg	2 ml

dosagem habitual

- a. Prazo de validade após a primeira abertura: 12 meses.
b. Sem prazo de validade após a primeira abertura definido pelo titular.

FORMULÁRIO DE MEDICAMENTOS UMP Introdução de 5 substâncias ativas

- **OXCARBAZEPINA:** Usado no tratamento em monoterapia ou em associação, das crises parciais, com ou sem generalização [Família: 2. Sistema Nervoso Central | Subfamília: Antiepiléticos e anticonvulsivantes]
- **METILFENIDATO:** Usado no combate à fadiga em situações paliativas. É uma substância controlada (Tabela II-B) [Família: 2. Sistema Nervoso Central | Subfamília: Estimulante inespecífico do Sistema Nervoso Central]
- **MIDODRINA:** Usado na hipotensão arterial sintomática. Substitui a ETILEFRINA que deixou de ser comercializada. [Família: 3. Aparelho Cardiovascular | Subfamília: Simpaticomiméticos]
- **PILOCARPINA:** Medicamento de ação sistémica usado na secura de boca. Atualmente em voga nos cuidados paliativos. [Família: 6. Aparelho Digestivo | Subfamília: Medicamentos que atuam na boca e orofaringe]
- **DOXAZOSINA:** Usado na retenção urinária e indicado em situação de hiperplasia benigna da próstata. [Família: 7. Aparelho Geniturinário | Subfamília: Outros medicamentos usados em disfunções geniturinárias]